

DATE [] [] [] [] [] [] [] [] [] []


Patient(e) Âge [] [] []
 Sexe M F

Questionnaire FACE : évaluation de la consommation d'alcool en entretien

Les cinq questions qui suivent doivent être de préférence posées sans reformulation, et cotées selon les réponses spontanées des patients. En cas d'hésitation, proposer les modalités de réponses, en demandant de choisir « la réponse la plus proche de la réalité ». Les deux premières questions portent sur les douze derniers mois.

A quelle fréquence vous arrive-t-il de consommer des boissons alcoolisées ?					Score					
Jamais	0	1 fois par mois ou moins	1	2 à 4 fois par mois	2	2 à 3 fois par semaine	3	4 fois ou plus par semaine	4	<input type="text"/>
Combien de verres standard buvez-vous les jours où vous buvez de l'alcool ?										
1 ou 2	0	3 ou 4	1	5 ou 6	2	7 à 9	3	10 ou plus	4	<input type="text"/>
Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation d'alcool ?										
Non	0						Oui	4	<input type="text"/>	
Avez-vous déjà eu besoin d'alcool le matin pour vous sentir en forme ?										
Non	0						Oui	4	<input type="text"/>	
Vous est-il arrivé de boire et de ne plus vous souvenir ensuite de ce que vous avez pu dire ou faire ?										
Non	0						Oui	4	<input type="text"/>	
TOTAL									<input type="text"/>	

Un verre standard représente une de ces boissons :



Interprétation du score

	0 à 4	Risque faible
Pour les hommes	5 à 8	Risque élevé
	9 ou plus	Dépendance probable
	0 à 3	Risque faible
Pour les femmes	4 à 8	Risque élevé
	9 ou plus	Dépendance probable

L'intervention brève est destinée aux patients dans la situation de "risque élevé"